


گاسترکتومی



درچه مواردی نیاز به انجام عمل برداشتن معده است؟

پزشک جراح برای درمان شرایط زیر ممکن است انجام عمل جراحی برداشتن معده را توصیه کند :

* خونریزی

* التهاب

* سرطان معده

* پولیپ (برجسته شدن بافت مخاط معده)

انجام جراحه چه خطراتی برای من به همراه دارد؟

انجام هر جراحی و بیهوشی به نوبه خود خطراتی به همراه دارد ، امروزه انجام جراحی برداشتن معده بسیار ایمن است به خصوص اگر در مرکز مجهز و توسط تیم با تجربه انجام شود . خطرات انجام این جراحی بسیار نادر بوده و شامل :

- حساسیت به داروهای بیهوشی یا مشکلات تنفسی موقت به علت قرار دادن لوله تنفسی
- خونریزی ، عفونت و تشکیل لخته خون
- نشت ترشحات مسیر گوارشی از محل اتصال روده ها که می تواند منجر به عفونت و آبسه شود.

- تنگ شدن محل اتصال روده ها که می تواند منجر به انسداد مسیر گوارشی شود .

بعد از عمل جراحه چه مراقبتهایی لازم است؟

سرعت بهبودی شما و حال شما بعد از عمل جراحی به علت انجام شدن عمل بستگی دارد . بعد از عمل ممکن است لوله ای در بینی شما قرار داده شود که به خالی بودن معده شما کمک می کند و تا زمانی که روده ها بتوانند به طور مناسب کار کنند در محل خود باقی می ماند . بسیاری از مردم بعد از عمل درد متوسط دارند این درد به راحتی با داروهای مسکن کنترل می شود .

معمولا لازم است برای ۶ تا ۱۰ روز در بیمارستان بستری بمانید .

از پزشک خود در ارتباط با زمان شروع فعالیت ، تعویض پانسمان و استحمام سوال کنید . بهبودی کامل شما ممکن است چند هفته زمان ببرد .

کلینیک های فعال در بیمارستان مهر

| نام کلینیک | مکان کلینیک | ساعت فعالیت | داخلی | خدمات ارائه شده |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---|
| پرستاری خود مراقبتی قلب | طبقه همکف جنب بخش قلب | ۷-۱۴ | ۶۰۲ ۶۰۳ | ارائه خدمات آموزشی، کنترلی برای بیماران ترخیص شده از دپارتمان قلب |
| شیر مادر | طبقه دوم بخش جراحی ۴ اتاق ۲۲۰ | ۲۴ ساعته | ۳۲۰ | ارائه آموزش های شیردهی و رفع مشکلات در زمینه شیردهی و گذاشتن شیردوش |
| آموزش سلامت همگانی | طبقه همکف واحد مراقبت های روزانه | ۷:۳۰-۱۰ | ۱۷۷ | ارائه آموزش در مورد دیابت، فشار خون و سرطان و گرفتن فشار خون و قند خون رایگان از مراجعه کنندگان |
| اطفال | طبقه منهای یک جنب نگهبانی | ۹-۱۱ ۱۷:۳۰-۱۹ | ۵۸۷ | ارائه آموزش در مورد شیردهی و کنترل نوزاد و انجام اقدامات لازم و فتوتراپی |

شماره : MH/ED/۱۳۰.۶۲ تاریخ بازنگری : ۱۴۰۴/۸/۱

تاریخ بازنگری مجدد : ۱۴۱۰/۱۲/۱ گروه هدف : بیماران و همراهیان

منبع : وب سایت Medline plus وب سایت بیمارستان: Mehrhospital.com

عمل جراحی برداشتن معده یا گاسترکتومی

معده شما بین مری و روده کوچک قرار گرفته است. معده سه وظیفه دارد، نگهداری از غذای بلعیده شده، مخلوط کردن غذا با اسید معده و انتقال محتویات به روده کوچک.

اکثر مردم در معرض بیماری های معده هستند. سوزش سر دل و زخم معده در میان افراد بسیار شایع است. بسیاری از مشکلات معده بدون مراجعه به پزشک و با رعایت شیوه زندگی سالم، اجتناب از مصرف غذاهای چرب و غذا خوردن با آرامش و آهسته بهبود می یابد. اما بعضی مانند زخم های معده و برگشت محتویات معده به مری، به مراقبت های پزشکی نیاز دارند.

چه زمان به پزشک معالج مراجعه کنیم؟

در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:

- * وجود خون در مدفوع
- * درد شدید شکمی
- * سوزش سر دل که با خوردن داروهای ضد اسید رفع نشده است
- * کاهش وزن ناگهانی
- * تهوع و استفراغ یا اسهال طولانی مدت

پزشک معالج چگونه بیماری های معده را تشخیص می دهد؟

معمولا پزشک معالج در اولین اقدام شما را معاینه کرده و علائم گوارشی شما را بررسی می کند. یکی از روش هایی که در تشخیص مشکلات معده انجام می شود، آندوسکوپی است.

آندوسکوپی روشی است که طی آن پزشک لوله ای باریک و منعطف و مجهز به دوربین را از مسیر دهان وارد معده می کند. به این وسیله اصطلاحا آندوسکوپ گفته می شود و به پزشک امکان مشاهده داخل معده و روده را می دهد.

گاسترکتومی، جراحی است که طی آن همه یا بخشی از معده برداشته خواهد شد. در این عمل اگر بخشی از معده برداشته شود به آن گاسترکتومی پارشیال یا نسبی گفته می شود. اگر تمام معده برداشته شود به آن گاسترکتومی توتال یا کامل می گویند.

عمل جراحی زمانی انجام می شود که شما کاملا بیهوش هستید. در این حالت شما کاملا خواب هستید و هیچ دردی احساس نمی کنید. جراح با ایجاد برشی روی شکم، اقدام به برداشتن معده می کند. با توجه به عمل جراحی انجام شده، لازم است روده دوباره به باقیمانده معده یا به مری متصل شود. امروزه بعضی از جراحان، این عمل را به صورت لاپاروسکوپی انجام می دهند. در این روش، پزشک جراح با ایجاد چند برش کوچک روی شکم و وارد کردن تجهیزات از طریق این برش ها به داخل حفره شکم، اقدام به جراحی می کند. یکی از این تجهیزات لاپاروسکوپ بوده که لوله ای باریک و مجهز به نور و دوربین است و به جراح امکان مشاهده اعضای درونی را می دهد.