

شکاف کام و لب

در شکاف لب و کام سوراخی در بافت های دهان و لب بوجود می آید شکاف لب می تواند یک یا هر دو لب را درگیر کند و شدت آن از یک حفره کوچک تا یک حفره بزرگ متغیر است. سوراخ های بزرگ در لب به بافت بینی متغیر است. سوراخ های بزرگ در لب به بافت بینی گسترش می یابند.

شکاف کام سوراخی در پشت دهان است که می تواند تا جلوی آن ادامه داشته باشد آشنایی با آناتومی دهان در درک این بیماری به شما کمک می کند. کام با همان سقف دهان به ۲ بخش اصلی جلویی (سخت کام) و عقبی (نرم کام) تقسیم می شود. مهم ترین وظیفه آنها این است که بافت بینی را از دهان جدا کنند وجود هرگونه شکاف در آنها باعث می شود تا بیمار در حرف زدن و غذا خوردن با مشکل مواجه می شود. به همین دلیل زمانی که این نوزادان شیر می خوردند شیر از بینی آنها خارج می شود چون کام در طی دوران بارداری و جنین بخوبی رشد نکرده است و فضای بینی و دهان از یکدیگر جدا نیستند.

علت شکاف و کام

- ژنتیک: اگر یکی از اعضای خانواده به این اختلال مادرزادی مبتلا باشد احتمال بروز آن در کودک نیز افزایش پیدا می کند.

مشکلات دوران بارداری: به طور طبیعی بافت و دهان در طی ماه های دوم و سوم بارداری تکامل می یابند رشد این بافت ها در این نوزادان با اختلال مواجه می شود.

- برخی مادران به دلیل بیماریهای زمینه ایی مجبور هستند از داروهای خاص مانند داروهای ضد تشنج یا سرطان استفاده کنند.

اضافه وزن مادر و مصرف دخانیات و نوشیدنی های الکلی

- کمبود اسید فولیک

- بیماری های ژنتیکی

- بیماری زمینه ایی مانند دیابت

- بیماریهای عفونی مادر در طی بارداری

- کاهش سطح اکسیژن

علائم شکاف کام و لب

وجود حفره در این نواحی که دراول تولد نمایان می شود

درمان

جراحی شکاف کام و لب بهترین راه برای درمان این عارضه است .

عمل جراحی برای ترمیم شکاف و کام به بیهوشی عمومی نیاز دارد و معمولاً چیزی حدود دو سه ساعت طول می کشد برای بررسی وضعیت کودک پزشک متخصص درخواست می کند تا کودک یک یا ۲ روز در بیمارستان بستری باشد .

پس از جراحی آن لازم است کودک را با غذاهای سبک و نرم تغذیه کند و چندین هفته طول بکشد

—عوارض شکاف کام

مشکلات دندان

مشکلات تغذیه

عفونت گوش

مشکلات گفتاری

منبع: برونر سوارث